Etude de satisfaction de la pharmacie clinique au CHR d'Orléans

Clinical pharmacy: evaluation of physicians satisfaction in a French regional hospital

Hélène Rucheton, Laurie Akcora, Nathalie Saurel, Catherine Da Violante, Isabelle Hermelin
Service de pharmacie, CHR d'Orléans, Orléans, France

Résumé. La pharmacie clinique est une discipline centrée sur le patient dont l'objectif est d'optimiser la prise en charge thérapeutique. Cette activité, instaurée au Centre hospitalier régional d'Orléans (CHRO) en 2009, est pratiquée dans 8 unités de soins. L'objectif de notre étude était d'évaluer le niveau de satisfaction et les attentes des prescripteurs. **Matériel et méthodes.** Un questionnaire de satisfaction a été adressé aux 79 prescripteurs concernés. Trois items sont abordés : la pertinence des informations transmises, l'aspect relationnel, les attentes du prescripteur vis-à-vis des interventions du pharmacien. **Résultats.** Le taux de réponse était de 30 %, il est plus élevé pour les assistants (62,5 %), suivi des praticiens hospitaliers (30 %) et des internes (24 %). Concernant la pertinence des informations transmises au cours de l'analyse pharmaceutique, il ressort une satisfaction globale pour l'adaptation posologique, le signalement des contre-indications, les interactions médicamenteuses et redondances pharmacologiques et la proposition d'équivalents thérapeutiques. Les points à améliorer concernent les indications à la mise en place d'un traitement médicamenteux, les modalités d'administration, les suivis thérapeutique et clinique, la prévention des effets indésirables. L'aspect relationnel est jugé satisfaisant à 96 %. Les attentes du prescripteur vis-à-vis des interventions du pharmacien concernent l'information sur le médicament (97 %), l'aide aux déclarations de pharmacovigilance (93 %), l'information aux soignants (86 %), l'éducation thérapeutique (85 %) et la conciliation médicamenteuse (81 %). **Conclusion.** Le questionnaire doit être simplifié pour améliorer le nombre et la qualité des réponses pour une prochaine enquête. L'activité de pharmacie clinique est perçue très positivement par nos collègues cliniciens.

Mots clés : pharmacie, clinique, satisfaction

Abstract. Clinical pharmacy was established in The Regional Hospital of Orleans in 2009. Today, this activity is practiced in 8 medical care units. The aim of our study was to assess the level of physicians' satisfaction with the function of clinical pharmacist in a care unit. **Material and methods.** A satisfaction survey was proposed to the 79 physicians of the concerned medical care unit related to a clinical pharmacist. Three items were discussed: the relevance of relayed information, overall quality of interactions, and expectation of the physicians towards pharmacist's interventions. **Results.** Physicians' response rate was 30%, it was higher for the physician's assistants (62.5%), than the hospital practitioners (30%), and the residents (24%). As to the relevance of the transmitted information during pharmaceutical analysis, physicians are overall satisfied with dosage adjustments, report of contraindications, drug interactions, pharmacological redundancies, and proposal of therapeutic equivalents. The prescriber's expectations about the pharmacist's interventions were: information about the drugs (97%), assistance with drug safety declarations (93%), information to caregivers (86%), therapeutic education (85%), and drug mediation. For them, it was important to be properly guided for the establishment of a prescription, to be advised for administration, therapeutic, side effects and clinical follow-up. **Conclusion.** Clinical pharmacy activity is viewed very

Correspondance : H. Rucheton
<helene.rucheton@chr-orleans.fr>

positively by physicians who answered the questionnaire but it needs to be simplified to improve the number of responses for a next survey.

Key words: pharmacy, clinic, satisfaction

La pharmacie clinique a été définie par la Société française de pharmacie clinique (SFPC) comme « une discipline de santé centrée sur le patient dont l'exercice a pour objectif d'optimiser la prise en charge thérapeutique, à chaque étape du parcours de soins » [1].

L'objectif de notre étude était d'évaluer le degré de satisfaction et les attentes des prescripteurs, neuf ans après la mise en place de cette activité. Cette activité a fait l'objet de différentes évaluations en France et à l'étranger.

Matériel et méthodes

L'activité de pharmacie clinique a débuté en 2009 au Centre hospitalier régional d'Orléans (CHRO). Actuellement, huit unités de soins de l'établissement bénéficient d'une présence pharmaceutique effective au moins une fois par semaine. Dans le cadre de cette activité, en 2018, nous avons analysé 24 277 prescriptions avec 8 955 interventions pharmaceutiques et avec un taux de refus de 14 %. Le CHRO comporte 1 715 lits et places, dont : 1 551 lits de médecine-chirurgie-obstétrique (MCO), 70 places d'ambulatorio et hôpitaux de jour et 94 lits de soins de suite et réadaptation (SSR). Le fonctionnement de la pharmacie clinique repose sur un binôme pharmacien senior/interne pour différents services comme la pneumologie, les soins palliatifs, la médecine interne et la chirurgie orthopédique. D'autres services bénéficient seulement d'un senior comme la rhumatologie, l'infectiologie et la chirurgie digestive. Le centre pénitencier Orléans – Saran accueille un interne deux jours par semaine.

Après une revue de la littérature française et internationale sur l'appréciation par les prescripteurs de l'activité de pharmacie clinique en milieu hospitalier, nous avons déterminé des questions pertinentes [2-6]. Un questionnaire a été établi, avec pour objectifs un temps de réponse n'excédant pas trois minutes et un taux de réponse optimisé (*Annexe A*).

Trois items ont été abordés :

- la pertinence des informations transmises au cours de l'analyse pharmaceutique ;
- l'aspect relationnel ;
- les attentes du prescripteur vis-à-vis des interventions du pharmacien.

Le questionnaire est construit sous la forme de 23 questions courtes et fermées ; chacune permet au prescripteur de noter son degré de satisfaction de 1 à 5 et laisse la possibilité au prescripteur de rédiger un commentaire libre.

Concernant la pertinence des informations transmises au cours de la validation pharmaceutique, nous abordons 9 thèmes (grille de la Société française de pharmacie clinique) : interaction médicamenteuse, indication à la mise en place d'un traitement médicamenteux, redondance pharmacologique, adaptation posologique, modalités d'administration, équivalence thérapeutique, suivis thérapeutique et clinique, effets indésirables, contre-indication. Afin d'en faciliter la compréhension, chaque thème est illustré par un exemple concret d'intervention pharmaceutique.

L'aspect relationnel collige 6 thèmes : qualité de communication, disponibilité du pharmacien, éventuelle intrusion excessive, pertinence des interventions, réactivité et relationnel avec le service.

Les attentes du prescripteur vis-à-vis des compétences du pharmacien susceptibles de constituer une aide sont représentées par 8 thèmes. Ils concernent la réalisation de l'historique médicamenteux du patient, l'évaluation de l'observance du patient, l'analyse de la pertinence pharmaco-économique d'un traitement, l'information sur les médicaments, la transmission au pharmacien de ville, la rédaction de déclaration de pharmacovigilance, l'éducation thérapeutique, l'information des soignants sur le bon usage des médicaments et dispositifs médicaux.

Les unités de soins ciblées par l'enquête sont celles qui bénéficient de la présence d'un pharmacien clinicien au moins une fois par semaine. Ainsi, le questionnaire a été envoyé aux huit services de l'établissement disposant d'une présence pharmaceutique in situ : chirurgie digestive, chirurgie orthopédique, centre pénitentiaire (CPOS), infectiologie, médecine interne, pneumologie, rhumatologie, et soins palliatifs.

La liste des prescripteurs de chaque service ciblé a été récupérée auprès des affaires médicales de l'établissement. Cette liste précise pour chaque service le nombre de prescripteurs en fonction de leur statut (praticien hospitalier, praticien contractuel ou attaché, assistant, interne).

L'enquête s'est déroulée sur une période d'un mois. Les questionnaires ont été distribués de manière anonyme par l'intermédiaire des secrétariats de chaque unité de soins cible, par courrier interne le 03 septembre 2018. Chaque questionnaire rempli a été retourné au service en charge de la qualité et de la communication de l'établissement. Deux relances ont été effectuées après la distribution, chacune à 15 jours d'intervalle.

Lors de la réception des premiers questionnaires, il a été décidé de ne pas tenir compte dans l'analyse

de l'item « intrusion excessive » du fait de la non-compréhension par les praticiens du libellé (réponses aberrantes).

Les résultats quantitatifs sont présentés sous forme de moyenne +/- écart type et les résultats qualitatifs sous forme de pourcentage. Les résultats obtenus sous forme de cotations de 1 à 5 ont été additionnés puis présentés sous forme de pourcentages. Il a été décidé de réaliser un test exact de Fisher pour comparer le taux de réponse selon le type de service mais également selon le statut des répondants.

Résultats - Discussion

Pour les 8 services concernés par l'enquête, 79 prescripteurs ont été identifiés et ont reçu le questionnaire. La répartition des prescripteurs répondants par type de service (*figure 1*) et par statut est présentée dans le *tableau 1*. Au total, le taux de réponse s'élève à 30 % (n = 24). On observe une absence de différence significative dans les réponses en fonction du type de service concerné ($p = 0,155$) et on observe également une absence de différence significative concernant le statut des répondants ($p = 0,164$). Les praticiens hospitaliers présentent le meilleur taux de réponse (n = 14, soit 18 % de la population ciblée), suivis par les assistants et les internes (n = 5, soit 6 %). Aucun praticien attaché ou contractuel n'a répondu au questionnaire.

Notre taux de réponse (30 %) est plus bas que celui de l'équipe pharmaceutique d'Annecy (79 %) où la population cible était différente (en plus des médecins, infirmières

diplômées d'état et aides-soignantes étaient destinataires du questionnaire) et celui de l'équipe de Louven en Belgique [2, 5, 6]. Notre résultat est encourageant au regard de l'étude réalisée au CHU de Grenoble, qui avait recueilli 18 % de réponses [5]. Dans cette enquête, comme au CHRO aucun praticien attaché ou contractuel n'avait répondu au questionnaire.

Il en ressort une satisfaction globale pour l'adaptation posologique (*figure 2*), le signalement des contre-indications, interactions médicamenteuses et redondances pharmacologiques, la proposition d'équivalences thérapeutiques. Les points à améliorer concernent l'indication à la mise en place d'un traitement médicamenteux, les modalités d'administration, le suivi thérapeutique et clinique, la prévention des effets indésirables. Ce résultat est comparable à ceux observés dans la littérature [2-6].

Les résultats sur l'aspect relationnel mettent en évidence un degré de satisfaction élevé (96,3 %). Cela est en accord avec le ressenti des pharmaciens cliniciens qui reçoivent un accueil satisfaisant dans les unités de soins.

Les deux attentes principales des prescripteurs sont l'aide à la déclaration de pharmacovigilance lors de la suspicion d'une iatrogénie médicamenteuse et l'information sur les médicaments. Cet objectif est en adéquation avec le projet de service qui vise à encourager la déclaration par le biais des pharmaciens cliniciens : propositions de déclarations faites par les pharmaciens lors de la validation pharmaceutique, rédaction des déclarations par les internes en pharmacie et les pharmaciens seniors. Ainsi, nous avons fait 145 déclarations au Centre régional de pharmacovigilance de Tours

Figure 1. Répartitions des taux de réponse en fonction des services et de la catégorie des prescripteurs.

Tableau 1. Répartition des répondeurs par type de service et par statut.

Population cible (n = 79)	Répondeurs n (%)	Fisher (pour $\alpha = 0,05$)
Type de service		
Médecine (n = 60)	21 (35)	0,155
Chirurgie (n = 19)	3 (15,8)	
Statut		
Praticien hospitalier (n = 47)	14 (30)	0,164
Assistant (n = 8)	5 (63)	
Interne (n = 21)	5 (24)	
Praticien attaché ou contractuel (n = 3)	0 (0)	

pour l'année 2018 contre 35 en 2008 [7]. Le complément d'informations souhaité concerne principalement la stabilité des médicaments, la possibilité d'écraser/ouvrir les formes galéniques, et les données de pharmacocinétique. Dans ce contexte, un travail en interne a été réalisé sur les incompatibilités physico-chimiques des médicaments et sera prochainement diffusé à l'aide d'un support format poche. Une formation est réalisée depuis 2014 dans l'établissement sur le thème des médicaments écrasables.

Cette formation est basée sur le e-learning conçu par la SFPC en collaboration avec l'Omedit Haute Normandie et validée par l'Omedit de la région Centre. Elle a été réalisée auprès de 212 soignants et médecins [8]. Elle est accompagnée de la diffusion d'un livret listant les médicaments référencés, la possibilité ou non de les écraser, et l'alternative proposée à l'écrasement. Ce document faisant l'objet de mises à jour régulières est présent dans chaque unité de soins.

Figure 2. Résultats de l'enquête en fonction des 3 items.

Les médecins font part de leur souhait de bénéficier de la conciliation médicamenteuse dans leurs services (*Annexe B*). La conciliation est réalisée à l'entrée et à la sortie des patients permettant un meilleur lien avec les professionnels de ville. Ce processus formalisé prend en compte, à l'entrée du patient lors d'une nouvelle prescription, tous les médicaments pris et à prendre par le patient dans le but de réduire les erreurs médicamenteuses, et réaliser une continuité médicamenteuse [9]. Ce projet est en cours de déploiement au CHR d'Orléans. Depuis novembre 2018, elle a démarré dans le service de dermatologie puis s'est étendue au service de pneumologie et de chirurgie digestive et urologique (61 conciliations réalisées). Les patients cibles de l'hôpital sont ceux entrés par les urgences, de plus de 75 ans et avec plus de cinq lignes de traitement à l'entrée.

L'item Analyse de la pertinence pharmaco-économique est en cours d'amélioration avec la réalisation de différents travaux comme une plaquette sur les biosimilaires pour les MICI (maladies inflammatoires chroniques de l'intestin) et le RIC (rhumatisme inflammatoire chronique) permettant d'identifier les différents biosimilaires pour toutes les molécules de référence. Un document support est mis à disposition des prescripteurs et permet d'optimiser l'impact économique des prescriptions hospitalières exécutées en ville (PHEV). Cela facilite aussi le lien avec les pharmacies de ville. Dans ce même objectif, un pharmacien clinicien participe au comité ville/hôpital.

L'historique médicamenteux des patients devient accessible par la possible consultation du dossier pharmaceutique (DP) depuis fin 2018 au CHRO. Le but est à terme de pouvoir incrémenter ce DP en rétrocession pour avoir un meilleur suivi thérapeutique.

Les modalités d'administration ainsi que l'indication de la mise en place d'un traitement médicamenteux sont des items mal compris du fait de la discordance entre le nombre d'interventions pharmaceutiques réalisées, leurs taux de refus et le pourcentage de satisfaction de cette enquête. Pour l'item « Indication à la mise en place d'un traitement médicamenteux », le taux de refus est de 20 % sur l'année 2018. Concernant l'item « Modalités d'administration » ce taux est de l'ordre de 13 % sur cette même période.

Les principaux commentaires des cliniciens soulignent l'utilité de la coopération médico-pharmaceutique pour les services de soins et mettent en avant la valeur ajoutée de la pharmacie clinique pour les patients comme pour le corps médical. Aucun commentaire défavorable n'a été formulé.

Les limites de cette enquête sont principalement :
 – un taux de réponse trop faible pour une exploitation statistique ;
 – un déploiement de la pharmacie clinique dans les services les plus réceptifs de l'hôpital ce qui peut entraîner un biais de sélection.

Conclusion

La réalisation de cette première enquête de satisfaction nous a permis d'évaluer l'opinion très positive des cliniciens vis-à-vis de la pharmacie clinique. Cela permet également d'obtenir une référence pour les évaluations ultérieures. Le questionnaire sera revu lors d'une prochaine y incluant la conciliation médicamenteuse afin d'améliorer le taux de réponse. La qualité du lien avec le pharmacien d'officine, les données d'historique médicamenteux et d'observance pourront être améliorées grâce à la mise en place de la conciliation médicamenteuse et le développement du dossier pharmaceutique en cours de déploiement dans notre établissement. L'analyse de la pertinence pharmacoéconomique des prescriptions est également initiée en lien avec le développement des biosimilaires.

Cette enquête pourra faire l'objet d'un travail de fond pour un futur externe réalisant de la conciliation médicamenteuse et étant au plus près des cliniciens.

Liens d'intérêts : les auteurs déclarent ne pas avoir de lien d'intérêts en rapport avec cet article.

Références

1. *Projet SFPC: mise à jour de la définition de la pharmacie clinique*. 2016.
2. Jennings P, Lotito A, Baysson H, Pineau-Blondel E, Berlioz J. La pharmacie clinique en milieu hospitalier : une enquête de satisfaction auprès des prescripteurs. *Ann Pharm Fr* 2017 ; 75 (2):144-51.
3. Huet E, Berthet S, Pivot C, Paillet C. Satisfaction et attentes des prescripteurs vis-à-vis de l'analyse pharmaceutique des prescriptions sur deux unités de médecine internes. *Pharm Hosp Clin* 2015 ; 50 (2):162-7.
4. Kjeldsen L, Jensen T, Jensen J. Physicians' evaluation of clinical pharmacy revealed increased focus on quality improvement and cost savings. *Dan Med Bull* 2011 ; 58 : A4261.
5. Hias J, Walgraeve K, Tournoy J, Flamaing J, Spriet I, Van der Linden L. Physician's feedback on a clinical pharmacy program on geriatric wards. *Acta Clin Belg* 2019 ; 18 : 1-8.
6. Bourget S. Thèse d'exercice – Faculté Lyon 1 de pharmacie. *Activité pharmaceutique dans les services de soins au CHU de Grenoble: quelle adéquation avec les attentes des prescripteurs?* 2006.
7. Cadart M, Dubois A-L, Da Violante C. *Pharmacovigilance: quel rôle pour le pharmacien clinicien ?* 2016.
8. *Liste des médicaments écrasables* [Internet]. 2019, Consulté le 20 janvier 2020. <http://www.omedit-normandie.fr/boite-a-outils/bon-usage/liste-des-medicaments-ecrasables/liste-des-medicaments-ecrasables,3184,3511.html>
9. *Mettre en œuvre la conciliation des traitements médicamenteux en établissement de santé* [Internet]. Haute Autorité de Santé. Consulté le 20 janvier 2020 https://www.has-sante.fr/jcms/c_2736453/fr/mettre-en-oeuvre-la-conciliation-des-traitements-medicamenteux-en-etablissement-de-sante

Annexe A

Activité de Pharmacie Clinique :
Questionnaire de Satisfaction auprès des prescripteurs

Durée prévue de réponse : 3 minutes.

• Pertinence des informations transmises lors de l'analyse des prescriptions

Interaction médicamenteuse						-CLARITHROMYCINE + COLCHICINE → association contre-indiquée en raison du risque d'augmentation des effets indésirables de la colchicine, aux conséquences potentiellement fatales
Indication à la mise en place d'un traitement médicamenteux						-Hyperkaliémie persistante → ajout de KAYEXALATE? -Traitement par opioïde → ajout de laxatif ?
Redondance pharmacologique						-EUPANTOL + OGASTORO → Redondance pharmacologique
Adaptation posologique						-LOVENOX non recommandé si Cl créatinine < 15 ml/min -CEFEPIME : adaptation posologique selon le eDFG (risque d'EIG neurologiques)
Modalité d'administration						-PCA recommandée pour toute administration de morphine → absence de valve anti-retour et anti-siphon sur PSE
Equivalence thérapeutique						-TAREG 80mg (valsartan) non référencé au CHRO → proposons IRBESARTAN 150mg 1cp/j
Suivi thérapeutique et clinique						-INR= 6 --> posologie à revoir/INR à recontrôler? -Vancomycémie à doser à H48
Effet indésirable						-Hémorragie sous anticoagulant → déclaration de pharmacovigilance
Contre-indication						-Moxifloxacine contre-indiquée chez le patient épileptique

• Relationnel et communication

Bonne communication					
Disponibilité					
Intrusion excessive					
Pertinence des interventions					
Réactivité					
Relation avec le service					

<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td>Nom/Prénom du patient:</td></tr> <tr><td>DDN:</td></tr> <tr><td>SERVICE:</td></tr> <tr><td>Chambre:</td></tr> </table>	Nom/Prénom du patient:	DDN:	SERVICE:	Chambre:	<p>Date Conciliation d'entrée:</p> <p>Pharmacien/interne/externe:</p> <p>Médecin:</p>	<p>Date Conciliation de sortie</p> <p>Externe sc/Pharmacien:</p> <p>Médecin:</p>
Nom/Prénom du patient:																																																																													
DDN:																																																																													
SERVICE:																																																																													
Chambre:																																																																													
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%;">Pharmacie de ville</td> <td style="width: 10%;">tel/fax:</td> <td style="width: 40%;"></td> </tr> <tr> <td>Médecin traitant</td> <td>tel/fax:</td> <td></td> </tr> </table>	Pharmacie de ville	tel/fax:		Médecin traitant	tel/fax:		<p>Sources utilisées-> accord du patient: ☐ OUI ☐ NON ☐ non applicable</p> <table style="width: 100%;"> <tr> <td>☐ Dossier etb d'amont</td> <td>☐ Officine</td> </tr> <tr> <td>☐ Entretien Patient</td> <td>☐ CRH antérieur</td> </tr> <tr> <td>☐ DP</td> <td>☐ Entretien Famille</td> </tr> <tr> <td>☐ Ordonnance</td> <td>☐ Médecin traitant</td> </tr> </table>			☐ Dossier etb d'amont	☐ Officine	☐ Entretien Patient	☐ CRH antérieur	☐ DP	☐ Entretien Famille	☐ Ordonnance	☐ Médecin traitant																																																												
Pharmacie de ville	tel/fax:																																																																												
Médecin traitant	tel/fax:																																																																												
☐ Dossier etb d'amont	☐ Officine																																																																												
☐ Entretien Patient	☐ CRH antérieur																																																																												
☐ DP	☐ Entretien Famille																																																																												
☐ Ordonnance	☐ Médecin traitant																																																																												
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="3">Prescription de ville (dont automédication)</th> <th colspan="3">Prescription de sortie</th> </tr> <tr> <th>DCI/dosage/forme</th> <th>Posologie</th> <th>Devenir</th> <th>DCI/dosage/forme</th> <th>Posologie</th> <th>Argumentaire</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> </tbody> </table>						Prescription de ville (dont automédication)			Prescription de sortie			DCI/dosage/forme	Posologie	Devenir	DCI/dosage/forme	Posologie	Argumentaire																																																												
Prescription de ville (dont automédication)			Prescription de sortie																																																																										
DCI/dosage/forme	Posologie	Devenir	DCI/dosage/forme	Posologie	Argumentaire																																																																								
Envoi Médecin traitant o		Pharmacien d'officine o		IDE o		Date/paraphe:																																																																							
Information patient o						Allergie:																																																																							
Observance/bon usage:						<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td>Devenir</td><td>A= arrêté</td></tr> <tr><td></td><td>S= suspendu</td></tr> <tr><td></td><td>M= modifié</td></tr> <tr><td></td><td>R = remplacé</td></tr> <tr><td></td><td>C= conservé</td></tr> </table>		Devenir	A= arrêté		S= suspendu		M= modifié		R = remplacé		C= conservé																																																												
Devenir	A= arrêté																																																																												
	S= suspendu																																																																												
	M= modifié																																																																												
	R = remplacé																																																																												
	C= conservé																																																																												