

Dermatite atopique modérée à sévère : lancement d'une nouvelle spécialité générique (Takrozem Gé 0,1 %, pommade)

Pierre Fabre Dermatologie annonce la mise à disposition de Takrozem Gé 0,1 %, pommade.

Indications

Takrozem (1 mg de tacrolimus/1 g de pommade) est le générique de Protopic 0,1 %, pommade. Il est indiqué chez les adultes et les adolescents (16 ans et plus).

– **Traitement des poussées** : traitement de la dermatite atopique modérée à sévère de l'adulte en cas de réponse inadéquate ou d'intolérance aux traitements conventionnels, tels que les dermocorticoïdes.

– **Traitement d'entretien** : traitement de la dermatite atopique modérée à sévère pour la prévention des poussées et la prolongation des intervalles sans poussées chez les patients présentant des exacerbations très fréquentes de la maladie (au moins 4 par an) qui ont eu une réponse initiale à un traitement par tacrolimus pommade 2 fois par jour pendant 6 semaines maximum.

Posologie

Le traitement par TAKROZEM doit être instauré par des médecins possédant une expérience dans le diagnostic et le traitement de la dermatite atopique. Takrozem Gé peut être utilisé en cures courtes ou en traitement au long court intermittent. Le traitement ne doit pas être continu et doit débiter dès l'apparition des premiers signes et symptômes avec deux applications par jour sur chaque zone affectée de la peau jusqu'à disparition ou quasi-disparition des lésions. Par la suite, un traitement d'entretien peut être envisagé, si approprié avec une application par jour, 2 fois par semaine sur les zones habituellement affectées par la dermatite atopique.

