

Mise à disposition de Tremfya®[®], premier inhibiteur de l'IL-23 dans la prise en charge du psoriasis

Paris, le 20 février 2019 – Janssen annonce la mise à disposition de Tremfya® (guselkumab) pour les patients adultes atteints de psoriasis en plaques modéré à sévère qui nécessitent un traitement systémique.

Premier anticorps ciblant exclusivement l'interleukine 23 (IL-23), Tremfya® vient répondre aux besoins encore non-couverts des patients et contribue à améliorer significativement la prise en charge du psoriasis.

Un virage dans la prise en charge du psoriasis

Touchant 2 à 3 millions de personnes en France et souvent considérée comme bénigne, le psoriasis a pourtant des conséquences psychologiques et sociales sous estimées.

De nombreux patients n'ont pas encore trouvé la solution adaptée à leur psoriasis et ont une qualité de vie altérée. Avec Tremfya®, premier inhibiteur spécifique de l'IL23, Janssen propose un nouveau traitement pour répondre à leurs besoins.

Grâce à son mécanisme d'action innovant, Tremfya® permet aux patients de retrouver leur vie d'avant, pour longtemps. Il se lie de façon sélective à l'IL-23, une cytokine majeure du processus inflammatoire responsable du psoriasis, avec une spécificité et une affinité élevées.

Son schéma d'administration ne nécessite que 6 injections par an (après 1 injection à la semaine 0 et 1 et une injection à la semaine 4 lors de l'initiation). Il permet d'alléger la prise en charge des patients et ainsi d'améliorer leur observance.

Tremfya® a démontré sa supériorité par rapport à plusieurs traitements de référence. Bénéficiant d'une action rapide, il permet le blanchiment

complet du psoriasis chez la moitié des patients et une efficacité maintenue selon des données à 3 ans.

De plus, son arrêt n'entraîne pas de rebond de la maladie. Six mois après son interruption, environ 60 % des patients restent indemnes de toute récurrence de leur psoriasis.

Ce programme de développement clinique a également permis de mettre en avant un profil de tolérance rassurant.

En pratique

Tremfya® est un traitement injectable par voie sous cutanée. Il se présente en seringue pré-remplie contenant 100 mg de guselkumab dans 1 ml de solution. Le schéma thérapeutique comporte deux doses initiales, une dose à l'initiation du traitement et une dose 4 semaines plus tard, puis des doses d'entretien toutes les 8 semaines. Les injections doivent être réalisées dans les sites sans lésions psoriasiques.

La première prescription doit être réalisée par un dermatologue ou un médecin interniste en milieu hospitalier et le renouvellement peut être fait en ville par ces mêmes spécialistes. Après une formation adaptée à la technique d'injection sous cutanée, les patients peuvent réaliser eux-mêmes ces injections.

Tremfya est remboursé dans le traitement du psoriasis en plaques de l'adulte, chez les patients ayant psoriasis en plaque chronique sévère défini par un échec (réponse insuffisante, contre-indication ou d'intolérance) à au moins deux traitements systémiques (ciclosporine, acitrétine, méthotrexate et photothérapie) ; et une forme étendue et/ou un retentissement psychosocial important.