



Références

[1] Kalakonda N, Maerevoet M, Cavallo F, et al. Selinexor in patients with relapsed or refractory diffuse large B-cell lymphoma (SADAL) : a single-

arm, multinational, multicentre, open-label, phase 2 trial. *Lancet Haematol* 2020 ; 7 (7) : e511-22.

[2] The National Comprehensive Cancer Network diffus large B-cell lymphoma. 2017. <https://www.nccn.org/patients/guidelines/content/PDF/nhl-dif-fuse-patient.pdf>.

[3] Sehn LH, Herrera AF, Flowers CR, et al. Polatumab Vedotin in Relapsed or Refractory Diffuse Large B-Cell Lymphoma. *J Clin Oncol* 2020 ; 38 (2) : 155-65.



Vous avez reçu, au cours du mois d'octobre, le supplément 3 de la revue *Hématologie*, consacré aux actualités dans la leucémie lymphoïde chronique. Nous tenons à vous informer qu'une erreur s'est glissée dans la figure 2 de l'article intitulé « Stratégies thérapeutiques actuelles dans la leucémie lymphoïde chronique », de M.S Dilhuydy, A Quinquenel. Vous trouverez ci-dessous cette figure telle qu'il fallait la lire. Dilhuydy MS, Quinquenel A. Stratégies thérapeutiques actuelles dans la leucémie lymphoïde chronique. *Hématologie* 2020 ; 26 (S3) : 12-9.]

